

## 單元 7: 連續性

(課本 §1.6)

### 一. 口語, 直觀上的定義

函數  $f$  在點  $x = c$  連續 (continuous) 若且爲若函數  $f$  的圖形在點  $x = c$  處無斷開的現象.

三種圖形斷開 (亦即, 造成不連續) 的現象, 如下圖所示.

**現象 1:** 在點  $x = c_1$ ,  $f(c_1)$  未定義.

**現象 2.** 在點  $x = c_2$ ,

$$\lim_{x \rightarrow c_2} f(x)$$

不存在, 因爲根據圖示,

$$\lim_{x \rightarrow c_2^-} f(x) = 4$$

但

$$\lim_{x \rightarrow c_2^+} f(x) = 2$$

兩邊的行爲不一致，故極限不存在；雖然

$$f(c_2) = 4$$

有定義。

**現象 3.** 在點  $x = c_3$ ,

$$f(c_3) \neq \lim_{x \rightarrow c_3} f(x)$$

雖然

$$f(c_3) = 5$$

有定義，且

$$\lim_{x \rightarrow c_3} f(x) = 6$$

亦存在。

## 二. 正式定義

**定義 1** 令  $c \in (a, b)$  且  $f$  的定義域包含  $(a, b)$ . 則  
函數  $f$  在點  $x = c$  連續若且為若

**(i)**  $f(c)$  有定義。

(ii)  $f$  在點  $x = c$  的極限

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x)$$

存在.

(iii)  $f$  在點  $x = c$  的函數值等於極限值, 亦即,

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

**定義 2.** 函數  $f$  在開區間  $(a, b)$  上連續若且爲若  $f$  在  $(a, b)$  中的每一點均連續.

**註 1.** 由定義 1 的 (iii) 知, 若一函數在點  $x = c$  的極限可由代入法求得, 亦即,

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

則此函數在點  $x = c$  連續. 故

**(1)** 多項式在每一實數都連續, 因爲對任一實數  $c$ ,

$$\lim_{x \rightarrow c} p(x) = p(c)$$

(2) 有理函數在分母不等於 0 的地方均連續，因為若分母  $q(c) \neq 0$ ，則

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{p(c)}{q(c)}$$

註 2. 非連續點 (discontinuous points)，如圖中的  $c_1, c_2, c_3$ ，可分成如下的二類.

(1) 可移除的 (removable): 經由重新定義，可使其成為連續點的非連續點，此乃相當於極限存在，卻不連續的情形，因為只要將函數值重新定義成極限值即可，例如，點  $x = c_1$ ，原先：

$$\lim_{x \rightarrow c_1} f(x) = 5$$

但  $f(c_1)$  未定義，所以不連續.

修正：令

$$f(c_1) = 5$$

則

$$f(c_1) = 5 = \lim_{x \rightarrow c_1} f(x)$$

故變成連續.

點  $x = c_3$ , 原先:

$$f(c_3) = 5 \neq 6 = \lim_{x \rightarrow c_3} f(x)$$

故不連續.

修正: 令  $f(c_3) = 6$ , 則

$$f(c_3) = 6 = \lim_{x \rightarrow c_3} f(x)$$

故在  $x = c_3$  連續.

(2) 不可移除的 (nonremovable): 無法改變非連續性的非連續點, 此乃相當於**極限不存在**的情形, 因為極限是由那點附近的行爲所決定, 與那點的函數值不相干, 故無論如何定義那點的值, 那點附近的行爲還是一樣, 因而極限依然不存在, 無法滿足那點的極限值等於函數值的條件, 所以還是不連續, 例如, 點  $x = c_2$ , 原先:

$$\lim_{x \rightarrow c_2} f(x)$$

不存在, 因為

$$\lim_{x \rightarrow c_2^-} f(x) = 4 \neq 2 = \lim_{x \rightarrow c_2^+} f(x)$$

故不連續.

修正：不可行，因為只改變在點  $x = c_2$  的函數值，這點附近的行為並沒改變，故極限值依然不存在，因而依然是非連續。

**例 1.** 試求下列各函數的連續點及非連續點。

$$(a) f(x) = \frac{1}{x}$$

$$(b) f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

$$(c) f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$$

<解> (a)  $f(x)$  為一有理函數，且分母等於 0 乃相當於  $x = 0$ ，所以除了  $x = 0$  以外， $f$  在其餘點均連續。故，

$$\text{連續點} = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$$

又

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \frac{1}{0^+} = \infty$$

其中  $0^+$  表示任意靠近 0 的正數. 故在非連續的點  $x = 0$  的雙邊極限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$$

不存在. 因此,  $x = 0$  為一不可移除的非連續點. 另外,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

其中  $0^-$  表示任意靠近 0 的負數. 因此, 當  $x$  由左邊任意靠近 0 時, 函數值  $f(x)$  是無界地遞減, 圖示如下.

(b)  $f(x)$  是一有理函數, 且分母等於 0 乃相當於  $x = 1$ . 因此,

$$\text{連續點} = (-\infty, 1) \cup (1, \infty)$$

又

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x + 1)(x - 1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2 \end{aligned}$$

故令

$$f(1) = 2$$

時, 則函數  $f$  在  $x = 1$  變成連續. 因此,  $x = 1$  為一可移除的非連續點, 如圖所示.

(c)  $f(x)$  為一有理函數，且分母恆不等於 0，故  $f$  在每一實數都連續。因此，

$$\text{連續點} = (-\infty, \infty)$$

### 三. 閉區間上的連續性

**定義 3.** 設函數  $f$  的定義域為閉區間  $[a, b]$ ，則  $f$  在閉區間  $[a, b]$  上連續若且為若

(i)  $f$  在開區間  $(a, b)$  上連續。

(ii)  $x$  由右邊任意靠近  $a$  時，

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

亦即， $f$  在  $x = a$  的右邊連續，且當  $x$  由左邊任意靠近  $b$  時，

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$$

亦即， $f$  在  $x = b$  的左邊連續。也就是說，只考慮端點在定義域內的單邊連續性，因為不在定義域內的端點的另一邊無從考慮，故此較鬆的條件是合理的。

**例 2.** 令函數

$$g(x) = \begin{cases} 5 - x, & -1 \leq x \leq 2, \\ x^2 - 1, & 2 < x \leq 3. \end{cases}$$

試討論  $g$  的連續性.

<解> 函數  $g(x)$  的定義域爲  $[-1, 3]$ , 可將其分成三部分, 分別討論連續性如下:

**(1)  $[-1, 2)$ :** 此時

$$g(x) = 5 - x$$

爲一多項式, 故  $g$  在其上連續.

**(2)  $(2, 3]$ :** 此時

$$g(x) = x^2 - 1$$

亦爲一多項式, 故  $g$  在其上亦連續.

**(3) 連接點  $x = 2$ :** 首先,

**(i)**  $g(2) = 5 - 2 = 3$ , 故函數  $g$  在點  $x = 2$  有定義.

(ii) 當  $x$  由右邊接近 2 時的單邊極限

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 - 1) = 4 - 1 = 3$$

且由左邊接近 2 時的單邊極限

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (5 - x) = 5 - 2 = 3$$

結果一致. 故函數  $g$  在點  $x = 2$  的雙邊極限

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 3$$

是存在的.

(iii) 由 (i) 與 (ii), 得

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 3 = g(2)$$

亦即, 函數  $g$  在  $x = 2$  的極限值等於函數值.

因此, 根據連續性的定義, 函數  $g$  在點  $x = 2$  也連續.

最後, 合併 (1)-(3), 得函數  $g$  在閉區間  $[-1, 3]$  上均連續.

#### 四. 最大整數函數

最大整數函數 (greatest integer function) 又稱作  
高斯函數, 定義為

$$[[x]] \stackrel{\text{def}}{=} \text{小於或等於 } x \text{ 的最大整數}$$

例如,

$$[[1.5]] = 1, [[3]] = 3, [[-2.1]] = -3$$

以及

$$[[-5]] = -5, [[0.5]] = 0, \dots$$

其圖形如下, 乃一種階梯函數 (step function). 由圖知, 當  $x$  由右邊接近 2 的單邊極限

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} [[x]] = \lim_{x \rightarrow 2^+} 2 = 2$$

且當  $x$  由左邊接近 2 的單邊極限

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} [[x]] = \lim_{x \rightarrow 2^-} 1 = 1$$

結果不一致. 故

$$\lim_{x \rightarrow 2} [[x]]$$

不存在, 因而  $x = 2$  為一個不可移除的非連續點.

同理, 令  $n$  為任一整數, 當  $x$  由右邊接近  $n$  時,

$$x > n \text{ 且 } x < n + 1$$

故右單邊極限

$$\lim_{x \rightarrow n^+} [[x]] = \lim_{x \rightarrow n^+} n = n$$

當  $x$  由左邊接近  $n$  時,

$$x < n \text{ 且 } x > n - 1$$

故左單邊極限

$$\lim_{x \rightarrow n^-} [[x]] = \lim_{x \rightarrow n^-} (n - 1) = n - 1$$

結果不一致. 因此, 雙邊極限

$$\lim_{x \rightarrow n} [[x]]$$

不存在, 由此導出  $x = n$  為一不可移除的非連續點. 綜合上述, 得所有的整數, 即  $0, \pm 1, \pm 2, \dots$ , 均為不可移除的非連續點, 與圖形一致.

**應用 1.** 模型化成本函數. 設某裝訂公司在一個 8 小時的輪班 (shift) 中可裝訂 10,000 本書且固定成本 (每個輪班) 為 \$5,000. 若裝訂一本需 \$3. 試求裝訂  $x$  本的總成本.

<解> 令  $C(x)$  為裝訂  $x$  本的總成本. 根據題意, 當

$$x = 0$$

時，不需要任何輪班及裝訂，故總成本

$$C = 0$$

當

$$1 \leq x \leq 10000$$

時，需要 1 個輪班及裝訂  $x$  本書，故總成本

$$C = 5000(1) + 3x$$

當

$$10001 \leq x \leq 20000$$

時，需要 2 個輪班及裝訂  $x$  本書，故總成本

$$C = 5000(2) + 3x$$

當

$$20001 \leq x \leq 30000$$

時，需要 3 個輪班及裝訂  $x$  本書，故總成本

$$C = 5000(3) + 3x$$

以此類推，可導出每超過一個 10,000 本書，就要多一個輪班，而造成固定成本增加 \$5,000. 因此，根據前述列舉的情況，可歸納出，當  $x = 0, 1, 2, \dots$  時，總成本

$$C(x) = 5000 \left( 1 + \left[ \left[ \frac{x - 1}{10000} \right] \right] \right) + 3x$$

且圖形如下.

**應用 2. 複利 (compound interest).** 將利息加入本金 (deposit) 中, 一起生利息的方式, 稱作複利. 例如, 設本金為 \$10,000, 年利率 (annual interest rate) 為 6%, 且採用季複利 (compounded quarterly), 亦即, 每季 (3 個月) 期滿後, 計算利息, 並加入本金, 繼續生息, 則

$$\text{每季的利率} = \frac{0.06}{4} = 0.015$$

(因為一年有四季), 且在第一季內的結餘為

$$10,000$$

第二季內的結餘為

$$10,000 + 10,000(0.015) = 10,000(1 + 0.015)$$

第三季內的結餘為

$$\begin{aligned} & 10,000(1 + 0.015) + 10,000(1 + 0.015) \cdot \\ & \quad (0.015) \\ & = 10,000(1 + 0.015)^2 \end{aligned}$$

第四季內的結餘為

$$10,000(1 + 0.015)^3$$

第五季內的結餘為

$$10,000(1 + 0.015)^4$$

⋮

由此導出每滿  $\frac{1}{4}$  年，多計算一次利息並加入本金，亦即，  
多乘一次  $(1 + 0.015)$ . 因此，儲蓄  $t$  年後的結餘

$$A = 10,000(1 + 0.015)^{[4t]}$$

且圖形如下.

問. 跳躍 (jump) 的高度是多少？均一樣嗎？